



ग्रामाभ्युदयादेव देशाभ्युदयः  
गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय  
कृषि मौसम विज्ञान विभाग, कृषि महाविद्यालय  
पन्तनगर-263145 उधम सिंह नगर (उत्तराखण्ड)  
फोन नम्बर: 05944-233032



## ग्रामीण कृषि मौसम सेवा बुलेटिन, विकास खण्ड – काशीपुर (उधम सिंह नगर)

उपमहानिदेशक (कृषि मौसम विज्ञान), भारत मौसम विज्ञान विभाग, पुणे

निदेशक, मौसम केन्द्र, देहरादून

वर्ष: 2 अंक: 36 बुलेटिन अवधि: 8 – 12 मई, 2019 दिन: मंगलवार दिनांक: 7 मई, 2019

### विकास खण्ड काशीपुर हेतु मौसम पूर्वानुमान:

आगामी पांच दिनों में, 12 मई को कहीं-कहीं बूँदा-बाँदी तथा शेष दिन मौसम साफ रहेगा। अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान क्रमशः 36 से 37 डिग्री सेल्सियस तथा 19 से 22 डिग्री सेल्सियस रहने की सम्भावना है। हवा 12.0 से 17.0 कि०मी० प्रति घंटा की गति से मुख्यतः पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा से चलने का अनुमान है।

ऐसे अनुमानित मौसम में गो०ब० पन्त कृषि एवं प्रौद्यो० विश्वविद्यालय, पन्तनगर के वैज्ञानिकों द्वारा इस क्षेत्र के कृषक भाइयों को सलाह दी जाती है कि इस मौसम में विभिन्न फसलों के लिए खेतों में निम्नानुसार कार्यक्रम अपनायें।

### कृषि मौसम परामर्श

- ❖ मई माह में खेत की मेड़ बन्दी कर जुताई कर के छोड़ दे। ग्रीष्मकालीन जुताई से खेत के कीटों एवं बीमारियों के लारवा एवं खरपतवार आदि के बीज नष्ट हो जाते हैं मेड़ बन्दी से वर्षा जल खेत में ही रहेगा तथा जल बहाव के साथ मिट्टी बहकर बाहर नहीं जाएगी।
- ❖ लोबिया व फासबीन में जड़ एवं तना गलन रोग की रोकथाम हेतु कार्बन्डाजिम 1 ग्राम/ली० पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें।
- ❖ बसंतकालीन मक्का की फसल में नमी कम होने पर सिंचाई करें। पर्ण छेदक कीट के नियंत्रण हेतु मोनोक्रोटोफॉस का 625 मिली०/है० की दर से छिड़काव करें।
- ❖ लोबिया व फासबीन में जड़ एवं तना गलन रोग की रोकथाम हेतु कार्बन्डाजिम 1 ग्राम/ली० पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें।
- ❖ अगर सिंचाई की सुविधा है तो गेंहूँ एवं अन्य रबी फसलों की कटाई के बाद खाली खेत में हरी खाद हेतु ढैंचा तथा सनई की बुवाई करें।
- ❖ कद्दू वर्गीय सब्जियों में पत्तियों में सिकुड़े हुए चित्तकबरे पत्ते दिखाई देने पर ग्रसित पौधों को निकालकर नष्ट करें तथा रस चूसने वाले कीड़ों के नियंत्रण हेतु सर्वांगी कीटनाशी का छिड़काव करें।
- ❖ पत्तियों पर अनियमित आकार के पीले धब्बे दिखाई पड़ने पर, मैनकोजेब 2.5 ग्रा० प्रति ली० पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें।
- ❖ आम में बैक्टीरियल कैंकर की सम्भावना होने पर 200 पी पी एम स्ट्रैप्टोसाइकलिन ;200 मिलीग्राम/लीटर का छिड़काव करें।
- ❖ आम के बाग में डांसी मक्खी के लिए काष्ठ निर्मित यौन गंध ट्रैप को पेड़ पर लगाना चाहिए (10 ट्रैप/है०)। यौन गंध ट्रैप को दो माह में बदल देना चाहिए।
- ❖ कोयलिया और आन्तरिक विगलन के नियंत्रण के लिए 1.0 प्रतिशत (10 ग्रा०/ली०) बोरेक्स का छिड़काव करना चाहिए।
- ❖ गर्मी के मौसम में पशुशाला के आसपास की नालियों में मेलथियोथॉन अथवा अन्य कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव समय समय पर कराते रहे।
- ❖ इस गर्मी के दिनों में पशुओं के लिए पानी की उचित व्यवस्था करें। पीने के पात्र को साफ रखना चाहिए और दिन के समय पशुओं को कम से कम चार बार पानी जरूर पिलाये।

डा० आर० के० सिंह  
प्राध्यापक एवं प्रिंसिपल नोडल अधिकारी  
ग्रामीण कृषि मौसम सेवा,  
गो.ब. पन्त कृषि एवं प्रौद्यो. विश्वविद्यालय, पन्तनगर