



**ग्रामीण कृषि मौसम सेवा**  
भारत मौसम विज्ञान विभाग  
गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय  
उधम सिंह नगर, पंतनगर, उत्तराखंड



## मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 17-02-2026

नैनीताल(उत्तराखंड) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-02-17 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-02-18	2026-02-19	2026-02-20	2026-02-21	2026-02-22
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	19.0	19.0	20.0	20.0	20.0
न्यूनतम तापमान(से.)	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	62	47	46	47	48
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	23	19	20	21	20
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	7	8	6	8	7
पवन दिशा (डिग्री)	140	50	360	290	290
क्लाउड कवर (ओक्टा)	0	4	2	0	0
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं				

### पूर्वानुमान सारांश:

आगामी सप्ताह में बारिश की कोई संभावना नहीं है और न ही कोई चेतावनी जारी की गई है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 19.0 से 20.0 डिग्री सेल्सियस और 6.0 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। हवा दक्षिण-पूर्व, उत्तर-पूर्व, उत्तर और पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा से 6-8 किमी प्रति घंटे की गति से चलने की संभावना है। आगामी सप्ताह के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है।

### मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

मौसम संबंधी कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है।

### मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

कृषि पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं या उससे संबंधित सलाह।

### सामान्य सलाहकार:

मौसम का पूर्वानुमान "मौसम ऐप" पर नियमित रूप से अपडेट किया जाता है और मौसम संबंधी कृषि-मौसम विज्ञान संबंधी सलाह "मेघदूत ऐप" पर नियमित रूप से अपडेट की जाती है। बिजली गिरने की जानकारी के लिए "दामिनी ऐप" उपलब्ध है। मौसम, मेघदूत और दामिनी ऐप गूगल प्ले स्टोर (एंड्रॉइड उपयोगकर्ता) और ऐप सेंटर (आईओएस उपयोगकर्ता) से डाउनलोड किए जा सकते हैं। 20 से 26 फरवरी तक के विस्तारित पूर्वानुमान में भारी बारिश की कमी, सामान्य से अधिक अधिकतम और सामान्य न्यूनतम तापमान का संकेत मिलता है।

### लघु संदेश सलाहकार:

आईएमडी के अनुसार, कोई महत्वपूर्ण चेतावनी जारी नहीं की गई है, इसलिए गेहूं की फसल में सिंचाई की जानी चाहिए और नियमित रूप से रोग/कीटों की निगरानी की जानी चाहिए।

### फसल विशिष्ट सलाह:

फसल	फसल विशिष्ट सलाह
चना	फसल में फूल आने और फली भरने की अवस्था में सिंचाई करनी चाहिए। यदि फली छेदक कीट लग जाए तो उचित जैविक (5% नीम के बीज का अर्क या बीटी 1 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर) और रासायनिक नियंत्रण (क्लोरेनट्रानिलिप्रोले 18.5 एसएल 125 मिली) का प्रयोग करना चाहिए। पहला छिड़काव 50% फूल आने की अवस्था में करना चाहिए।
मसूर की दाल	फसल में फूल आने और फली भरने की अवस्था में सिंचाई करनी चाहिए। यदि फली छेदक कीट लग जाए तो उचित जैविक (5% नीम के बीज का अर्क या बीटी 1 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर) और रासायनिक नियंत्रण (क्लोरेनट्रानिलिप्रोले 18.5 एसएल 125 मिली) का प्रयोग करना चाहिए। पहला छिड़काव 50% फूल आने की अवस्था में करना चाहिए।
रेपसीड	फली के विकास के चरण में सिंचाई करनी चाहिए और नियमित रूप से रोग/कीटों की निगरानी करनी चाहिए। अल्टरनेरिया ब्लाइट रोग को नियंत्रित करने के लिए मैनकोज़ेब 75% का प्रयोग 2 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर की दर से 800-1000 लीटर पानी में मिलाकर 10 दिनों के अंतराल पर 2-3 बार करें, जबकि रतुआ रोग के मामले में मेटलैक्सिल 35 डब्ल्यूएस/रिडोमिल एमज़ 72 का प्रयोग 2.5 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर की दर से 800-1000 लीटर पानी में मिलाकर 10 दिनों के अंतराल पर 2-3 बार करें।
सरसों	फली के विकास के चरण में सिंचाई करनी चाहिए और नियमित रूप से रोग/कीटों की निगरानी करनी चाहिए। अल्टरनेरिया ब्लाइट रोग को नियंत्रित करने के लिए मैनकोज़ेब 75% का प्रयोग 2 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर की दर से 800-1000 लीटर पानी में मिलाकर 10 दिनों के अंतराल पर 2-3 बार करें, जबकि रतुआ रोग के मामले में मेटलैक्सिल 35 डब्ल्यूएस/रिडोमिल एमज़ 72 का प्रयोग 2.5 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर की दर से 800-1000 लीटर पानी में मिलाकर 10 दिनों के अंतराल पर 2-3 बार करें।
गेहूँ	फसल की सिंचाई करनी चाहिए और यूरिया का प्रयोग करना चाहिए।
जौ	फसल की सिंचाई करनी चाहिए और यूरिया का प्रयोग करना चाहिए।
गन्ना	शरद ऋतु में गन्ने की फसल में निराई-गुड़ाई के साथ-साथ सिंचाई भी करनी चाहिए।

### बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
नींबू	नींबू के पौधों को उचित पोषण और सिंचाई प्रदान करनी चाहिए ताकि फूल झड़ने से रोका जा सके।
सेम की फली	इस महीने बीन की बुवाई करी जा सकती है।
आलू	पके हुए आलूओं की तुड़ाई करें।

### पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भैंस	गाय/भैंस को केवल बरसीम, अगोला आदि जैसे अपरिष्कृत खाद्य पदार्थ ही नहीं खिलाने चाहिए। उन्हें हमेशा हरे चारे के साथ मानक मात्रा में सूखा चारा भी देना चाहिए। गाय/भैंस के बछड़ों के सींगों की कलियों को एक सप्ताह की उम्र में ही नष्ट कर देना चाहिए।
गाय	गाय/भैंस को केवल बरसीम, अगोला आदि जैसे अपरिष्कृत खाद्य पदार्थ ही नहीं खिलाने चाहिए। उन्हें हमेशा हरे चारे के साथ मानक मात्रा में सूखा चारा भी देना चाहिए। गाय/भैंस के बछड़ों के सींगों की कलियों को एक सप्ताह की उम्र में ही नष्ट कर देना चाहिए।

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
बकरा	भेड़ और बकरी के नवजात मेमनों का अच्छे से ख्याल रखें और उनकी देखभाल करें।
भेड़	भेड़ और बकरी के नवजात मेमनों का अच्छे से ख्याल रखें और उनकी देखभाल करें।

#### अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह:

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी)	अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह
सामान्य सलाह	फसलों में सिंचाई की जानी चाहिए।

#### मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

कोई खास असर नहीं।
-------------------

#### प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं और कोई आधारित परामर्श नहीं।
--

Farmers are advised to download Unified  Mausam  and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: [https://play.google.com/store/apps/details](https://play.google.com/store/apps/details/)

Damini MobileApp link : [https://play.google.com/store/apps/details](https://play.google.com/store/apps/details/)