



**ग्रामीण कृषि मौसम सेवा**  
भारत मौसम विज्ञान विभाग  
गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय  
उधम सिंह नगर, पंतनगर, उत्तराखंड



## मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 27-03-2026

नैनीताल(उत्तराखंड) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-03-27 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-03-28	2026-03-29	2026-03-30	2026-03-31	2026-04-01
वर्षा (मिमी)	1.0	0.0	4.0	3.0	2.0
अधिकतम तापमान(से.)	21.0	21.0	23.0	22.0	22.0
न्यूनतम तापमान(से.)	8.0	8.0	9.0	9.0	9.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	62	62	61	62	61
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	25	26	27	23	19
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	8	9	9	9	9
पवन दिशा (डिग्री)	280	140	140	140	290
क्लाउड कवर (ओक्टा)	1	3	3	5	3
चेतावनी	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	कोई चेतावनी नहीं

### पूर्वानुमान सारांश:

आगामी सप्ताह में 1-4 मिमी तक हल्की बूदाबांदी हो सकती है और गरज, बिजली, आंधी और तेज हवाओं के लिए पीली चेतावनी जारी की गई है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 21.0 से 23.0 डिग्री सेल्सियस और 8.0 से 9.0 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। हवा पश्चिम-उत्तर और दक्षिण-पूर्व दिशा से 8-9 किमी प्रति घंटे की गति से चलने की संभावना है। 27 और 30 मार्च को कुछ स्थानों पर गरज, बिजली, आंधी आदि और तेज हवाओं के लिए पीली चेतावनी जारी की गई है। अन्य दिनों के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। आगामी सप्ताह में नैनीताल के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश/गरज/बर्फबारी (3300 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर) होने की संभावना है।

### मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

27 और 30 मार्च को गरज-चमक, बिजली गिरने, तेज हवाओं आदि की आशंका के लिए पीली चेतावनी जारी की गई है।

### मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

खड़ी फसलों में पौधों का गिरना, अनाज और फलियों का झड़ना, कटाई के बाद उपज का खराब होना।

**सामान्य सलाहकार:**

मौसम का पूर्वानुमान "मौसम ऐप" पर नियमित रूप से अपडेट किया जाता है और मौसम संबंधी कृषि सलाह "मेघदूत ऐप" पर नियमित रूप से अपडेट की जाती है। बिजली गिरने की जानकारी के लिए "दामिनी ऐप" उपलब्ध है। मौसम, मेघदूत और दामिनी ऐप गूगल प्ले स्टोर (एंड्रॉइड उपयोगकर्ता) और ऐप सेंटर (आईओएस उपयोगकर्ता) से डाउनलोड किए जा सकते हैं। 27 मार्च से 2 अप्रैल तक के विस्तारित पूर्वानुमान में सामान्य से अधिक वर्षा और अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान सामान्य रहने का संकेत दिया गया है।

**लघु संदेश सलाहकार:**

मौसम विभाग के अनुसार, आंधी, बिजली, तेज हवाएं आदि और तेज सतही हवाओं का पूर्वानुमान है, इसलिए फसलों की सिंचाई करने से बचें और कटाई की गई उपज को अच्छी तरह से भंडारित करें।

**फसल विशिष्ट सलाह:**

फसल	फसल विशिष्ट सलाह
मसूर की दाल	सिंचाई और रायनिक उर्वरकों का प्रयोग शुष्क दिनों में ही करना चाहिए। फसल को अच्छी तरह से संग्रहित करें ताकि वह खराब न हो। फलियों को गिरने से बचाने के लिए पकी हुई फलियों को ही तोड़ लें।
सरसों	कटाई से पहले पकी हुई फसल को अच्छी तरह सुखा लेना चाहिए। कटाई के बाद उपज को खराब होने से बचाने के लिए अच्छी तरह से भंडारित करना चाहिए। सूखे दिनों में सिंचाई की व्यवस्था करनी चाहिए।
गेहूँ	सिंचाई का समय शुष्क दिनों में निर्धारित किया जाना चाहिए और खरपतवारनाशक/कीटनाशक का प्रयोग भी शुष्क दिनों में ही किया जाना चाहिए। यूरिया का प्रयोग शुष्क दिनों में मिट्टी में नमी आने के बाद किया जा सकता है।

**बागवानी विशिष्ट सलाह:**

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
सेम की फली	अंकुरित फ्रेंच बीन के पौधों को तेज हवाओं से बचाने के लिए सुरक्षात्मक जालों का उपयोग करें। छोटे पौधों को पानी देने से बचें और शुष्क दिनों में पानी लगाने की योजना बनाएं।
गाजर	बुवाई का समय शुष्क दिनों में निर्धारित किया जा सकता है।
मूली	बुवाई का समय शुष्क दिनों में निर्धारित किया जा सकता है।
बैंगन	सूखे दिनों में पॉलीहाउस/पॉलीनेट तैयार किया जा सकता है।
टमाटर	सूखे दिनों में पॉलीहाउस/पॉलीनेट तैयार किया जा सकता है।
शिमला मिर्च	सूखे दिनों में पॉलीहाउस/पॉलीनेट तैयार किया जा सकता है।

**पशुपालन विशिष्ट सलाह:**

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भेंस	गर्भवती पशुओं में प्रसवोत्तर ज्वर से बचाव के लिए, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने हेतु उन्हें प्रतिदिन 50-60 ग्राम खनिज मिश्रण खिलाना चाहिए, क्योंकि इस दौरान वे बांझपन और जॉन रोग (पैराट्यूबरकुलोसिस) के प्रति संवेदनशील होते हैं। वयस्क पशुओं में, फुट एंड माउथ रोग के टीकाकरण से 15 दिन पहले कृमिनाशक दवा का प्रयोग करना आवश्यक है।
गाय	गर्भवती पशुओं में प्रसवोत्तर ज्वर से बचाव के लिए, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने हेतु उन्हें प्रतिदिन 50-60 ग्राम खनिज मिश्रण खिलाना चाहिए, क्योंकि इस दौरान वे बांझपन और जॉन रोग (पैराट्यूबरकुलोसिस) के प्रति संवेदनशील होते हैं। वयस्क पशुओं में, फुट एंड माउथ रोग के टीकाकरण से 15 दिन पहले कृमिनाशक दवा का प्रयोग करना आवश्यक है।

**मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):**

फसलों का गिरना, अनाज और फलियों का झड़ना, कटाई के बाद उपज का खराब होना।

**प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):**

फसलों की सिंचाई करने से बचें और सिंचाई तथा अन्य रसायनिक प्रयोग के उपायों को शुष्क दिनों में ही निर्धारित करें।