



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
उधम सिंह नगर, पंतनगर, उत्तराखंड



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 26-09-2025

उधम सिंह नगर(उत्तराखंड) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2025-09-26 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2025-09-27	2025-09-28	2025-09-29	2025-09-30	2025-10-01
वर्षा (मिमी)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
अधिकतम तापमान(से.)	35.0	36.0	36.0	35.0	35.0
न्यूनतम तापमान(से.)	24.0	24.0	24.0	23.0	23.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	85	82	84	83	80
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	65	68	69	66	68
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	4	4	4	4	3
पवन दिशा (डिग्री)	10	60	30	10	60
क्लाउड कवर (ओक्टा)	2	2	1	1	0
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं

पूर्वानुमान सारांश:

पिछले सप्ताह (19 से 25 सितंबर) क्षेत्र में 1.2 मिमी वर्षा हुई और अधिकतम-न्यूनतम तापमान क्रमशः 31.4 से 34.2°C और 24.4 से 25.9°C के बीच रहा। सुबह और शाम की सापेक्षिक आर्द्रता क्रमशः 90-93% और 60-75% के बीच रही, जबकि हवा दक्षिण-दक्षिण-पश्चिम, दक्षिण-पश्चिम, पश्चिम-उत्तर-पश्चिम, पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम और पूर्व-दक्षिण-पूर्व से 1.5-3.7 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चली। पिछले सप्ताह मौसम साफ रहा। आगामी पूर्वानुमान के अनुसार 1 मिमी की हल्की बूदाबांदी होगी और अधिकतम-न्यूनतम तापमान क्रमशः 35.0-36.0°C और 23.0 से 24.0°C रहने की उम्मीद है। हवा उत्तर-पूर्व, उत्तर-पूर्व-पूर्व और उत्तर-पूर्व-उत्तर दिशा से 3-4 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की उम्मीद है। इस क्षेत्र के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

कोई चेतावनी नहीं।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

कोई प्रभाव नहीं।

सामान्य सलाहकार:

किसान और अन्य संबंधित समुदाय नियमित मौसम की जानकारी और वर्षा अलर्ट के लिए "मौसम" ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। "मेघदूत" और "दामिनी" जैसे अन्य ऐप भी क्रमशः मौसम संबंधी और बिजली संबंधी आंकड़ों के

नियमित अपडेट के लिए उपलब्ध हैं। सभी ऐप्स गूगल प्ले स्टोर (एंड्रॉइड उपयोगकर्ता) और ऐप सेंटर (आईओएस उपयोगकर्ता) से आसानी से डाउनलोड किए जा सकते हैं। विस्तारित अवधि का पूर्वानुमान 26.09.2025 से 02.10.2025 के दौरान भारी कम वर्षा और सामान्य अधिकतम-न्यूनतम तापमान प्रवृत्ति दर्शाता है।

लघु संदेश सलाहकार:

आईएमडी के अनुसार, कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है और न ही बारिश की भविष्यवाणी की गई है, इसलिए आवश्यकतानुसार सिंचाई की जानी चाहिए।

फसल विशिष्ट सलाह:

फसल	फसल विशिष्ट सलाह
चावल	सामान्य कीट, जैसे भूरा पादप फुदका, के प्रकोप पर, किसानों को ट्राइफ्लुमेज़ोपाइरिम 10 एससी 235 मिली/ फिप्रोनिल 5 एससी 1000 मिली/ बुप्रोफेज़िन 25 एससी 1 लीटर/ थियामेथोक्सम 25 डब्ल्यूएसजी 100 ग्राम, 500 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव तने के पास करना चाहिए। कम प्रकोप होने पर बुप्रोफेज़िन, अधिक प्रकोप होने पर ट्राइफ्लुमेज़ोपाइरिम और तना छेदक + भूरा पादप फुदका के आक्रमण पर फिप्रोनिल 5 एससी का प्रयोग करना चाहिए। फसल की आवश्यकतानुसार सिंचाई करनी चाहिए।
गन्ना	To prevent prevalent red rot disease, farmers need to keep their fields clean. The infested canes should be plucked from the root and burned to stop further spread. Complete destruction of infected canes and use of treated seeds are the best preventive measures.
गन्ना	शरदकालीन गन्ने की बुवाई कार्बेन्डाजिम 50% डब्ल्यू पी 0.1% घोल से उपचारित गन्ने के बीज को 10 मिनट तक भिगोकर करनी चाहिए। शरदकालीन बुवाई के लिए गन्ने के डंठल का निचला 2/3 भाग प्रयोग किया जाता है।
मक्का	उचित कृषि उपायों द्वारा कीटों के आक्रमण से बचें। फॉल आर्मीवर्म के आक्रमण की स्थिति में, क्लोरेंटानिलिप्रोल 18.5 एससी 0.4 मिली/लीटर पानी का प्रयोग करें। दूसरा छिड़काव 10-15 दिनों के अंतराल पर करें। तोड़ी हुई फसल को अच्छी तरह संग्रहित करें और शरदकालीन बुवाई की योजना बनाएं।
काला चना	सफ़ेद मक्खी द्वारा फैलने वाले पीले मोज़ेक वायरस के प्रकोप पर, पाइरीप्रॉक्सीफेन 10 ई.सी. 0.5 लीटर/ हेक्टेयर की दर से 500-600 लीटर पानी में मिलाकर 10-12 दिनों के अंतराल पर डालें। आवश्यकतानुसार फसल की सिंचाई करें।
मूँग	सफ़ेद मक्खी द्वारा फैलने वाले पीले मोज़ेक वायरस के प्रकोप पर, पाइरीप्रॉक्सीफेन 10 ई.सी. 0.5 लीटर/ हेक्टेयर की दर से 500-600 लीटर पानी में मिलाकर 10-12 दिनों के अंतराल पर डालें। आवश्यकतानुसार फसल की सिंचाई करें।
सोयाबीन	फूल/फली बनने पर मिट्टी में पर्याप्त नमी बनाए रखनी चाहिए। सफ़ेद मक्खी द्वारा फैलने वाले पीले मोज़ेक वायरस के प्रकोप पर, पाइरीप्रॉक्सीफेन 10 ई.सी. 0.5 लीटर/हेक्टेयर की दर से 500-600 लीटर पानी में मिलाकर 10-12 दिनों के अंतराल पर डालें। आवश्यकतानुसार फसल की सिंचाई करें।
मूँगफली	टिक्का रोग के उपचार हेतु क्लोरोथेनोनिल 2 किग्रा/हेक्टेयर या मैन्कोज़ेब 80% 2 किग्रा/हेक्टेयर या प्रोपिकोनाज़ोल 25 ई.सी. 500 मिली. को 800 से 1000 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से घोलकर 10-12 दिनों के अंतराल पर 2-3 बार छिड़काव करना चाहिए। पेगिंग या फलियों बनने पर आवश्यकतानुसार सिंचाई करके पर्याप्त नमी बनाए रखनी चाहिए।
तिल	फाइलोडी फाइटोप्लाज़्म के कारण होता है जो पौधों, फूलों और पत्तियों के आकार को गुच्छों में बदल देता है और प्लांट हॉपर द्वारा फैलता है। इसे फसल की समय पर बुवाई, मिथाइल-ओ-डेमेटन 25 ई.सी. 1.0 लीटर/हेक्टेयर की दर से 10-15 दिनों के अंतराल पर छिड़काव और प्रभावित पौधों को जलाकर रोका जा सकता है।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
गोभी	खेत में नियमित रूप से निराई-गुड़ाई जैसे कृषि कार्य करते रहें। मिट्टी में नमी बनाए रखें और फसलों की आवश्यकतानुसार सिंचाई करें।
मूली	खेत में मिट्टी की नमी बनाए रखनी चाहिए तथा फसल की नियमित निराई-गुड़ाई करनी चाहिए।
गाजर	खेत में मिट्टी की नमी बनाए रखनी चाहिए तथा फसल की नियमित निराई-गुड़ाई करनी चाहिए।
चुकंदर	खेत में मिट्टी की नमी बनाए रखनी चाहिए तथा फसल की नियमित निराई-गुड़ाई करनी चाहिए।

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
मेंथी	पत्तेदार सब्जियों के लिए यह बुवाई का सर्वोत्तम समय है। पूरे फसल मौसम के लिए 3-4 सिंचाई आवश्यक है और इस अवधि के दौरान मिट्टी में नमी बनाए रखनी चाहिए।
पालक	पत्तेदार सब्जियों के लिए यह बुवाई का सर्वोत्तम समय है। पूरे फसल मौसम के लिए 3-4 सिंचाई आवश्यक है और इस अवधि के दौरान मिट्टी में नमी बनाए रखनी चाहिए।
नींबू	यदि सिट्रस येलो मोजेक वायरस के लक्षण दिखाई दें, तो संक्रमित टहनियों की छंटाई करें और इमिडाक्लोप्रिड 17.8 एस एल 1 मिली/3 लीटर पानी या थायमेथोक्सम 25% डब्लू जी 1 ग्राम/3 लीटर पानी जैसे प्रणालीगत कीटनाशक का छिड़काव करें। थायमेथोक्सम का पहला छिड़काव कीट के शुरुआती लक्षण दिखने पर करें और कीट की तीव्रता के आधार पर 15-21 दिनों के अंतराल पर 2-3 छिड़काव दोहराएँ।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	15 दिनों के बाद बछड़ों को कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक, आयरन, आयोडीन और तांबा तत्वों को नमक मिश्रण या खनिज बूंदों के रूप में सेवन करना चाहिए।
भेंस	'फुटरोट' रोग से बचाव के लिए खुरों को 10% फॉर्मेलिन घोल या 5% नीले घोल में सुबह-शाम 2-3 मिनट के लिए कम से कम 3 दिनों तक डुबोकर रखना चाहिए।
बकरा	ग्रामीण क्षेत्रों में भेड़-बकरियों को एक माह पर टेटनस टॉक्साइड के 2 टीके तथा 5 माह पर दूसरा टीका लगवाना चाहिए, ताकि नवजात मेमनों को टेटनस रोग न हो।
भेड़	ग्रामीण क्षेत्रों में भेड़-बकरियों को एक माह पर टेटनस टॉक्साइड के 2 टीके तथा 5 माह पर दूसरा टीका लगवाना चाहिए, ताकि नवजात मेमनों को टेटनस रोग न हो।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

कोई संभावित प्रभाव नहीं।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

कोई प्रभाव नहीं।

Farmers are advised to download Unified  "Mausam" and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>