



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
उधम सिंह नगर, पंतनगर, उत्तराखंड



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 27-03-2026

उधम सिंह नगर(उत्तराखंड) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-03-27 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-03-28	2026-03-29	2026-03-30	2026-03-31	2026-04-01
वर्षा (मिमी)	3.0	0.0	1.0	3.0	2.0
अधिकतम तापमान(से.)	32.0	32.0	34.0	33.0	33.0
न्यूनतम तापमान(से.)	14.0	14.0	16.0	16.0	16.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	55	55	52	54	52
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	18	19	18	16	14
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	7	7	7	7	8
पवन दिशा (डिग्री)	280	140	140	140	290
क्लाउड कवर (ओक्टा)	1	3	3	5	3
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं

पूर्वानुमान सारांश:

पिछले सप्ताह (20 से 26 मार्च) कोई वर्षा दर्ज नहीं की गई और अधिकतम-न्यूनतम तापमान क्रमशः 18.0 से 30.5 डिग्री सेल्सियस और 12.5 से 16.5 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता क्रमशः 70-89% और 40-88% के बीच रही। हवा पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम, पश्चिम-उत्तर-पश्चिम और पश्चिम दिशा से 7.0-8.0 किमी प्रति घंटे की गति से चली। पिछले सप्ताह कुछ दिन आसमान में बादल छाए रहे। आने वाले सप्ताह में 1-3 मिमी हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है और अधिकतम-न्यूनतम तापमान क्रमशः 32.0-34.0 डिग्री सेल्सियस और 14.0-16.0 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा उत्तर-पश्चिम, पश्चिम-उत्तर-पश्चिम और दक्षिण-पूर्व दिशा से 7-8 किमी प्रति घंटे की गति से चलने की संभावना है। आने वाले सप्ताह में शुष्क मौसम रहने की संभावना है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

कोई महत्वपूर्ण मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

कोई असर नहीं।

सामान्य सलाहकार:

मौसम का पूर्वानुमान "मौसम ऐप" पर नियमित रूप से अपडेट किया जाता है और मौसम संबंधी कृषि सलाह "मेघदूत ऐप" पर नियमित रूप से अपडेट की जाती है। बिजली गिरने की जानकारी के लिए "दामिनी ऐप" उपलब्ध

है। मौसम, मेघदूत और दामिनी ऐप गूगल प्ले स्टोर (एंड्रॉइड उपयोगकर्ता) और ऐप सेंटर (आईओएस उपयोगकर्ता) से डाउनलोड किए जा सकते हैं। 27 मार्च से 2 अप्रैल तक के विस्तारित पूर्वानुमान में सामान्य से अधिक वर्षा और अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान सामान्य रहने का संकेत दिया गया है।

लघु संदेश सलाहकार:

मौसम विभाग के अनुसार, कोई महत्वपूर्ण मौसम चेतावनी नहीं है और आगे शुष्क दिनों की उम्मीद है, इसलिए सिंचाई की जा सकती है और रसायनिक पदार्थों का प्रयोग भी किया जा सकता है।

फसल विशिष्ट सलाह:

फसल	फसल विशिष्ट सलाह
चना	सिंचाई का समय निर्धारित किया जा सकता है और फली छेदक, पत्ती रोग और मूह के हमले से बचाव के लिए रसायनिक पदार्थ का प्रयोग भी निर्धारित किया जा सकता है। यदि फलियाँ पक चुकी हों, तो उन्हें भंडारण से पहले अच्छी तरह सुखाया जा सकता है। हालांकि, तुड़ाई के बाद उत्पाद को छाया में सुखाना चाहिए।
मसूर की दाल	सिंचाई का समय निर्धारित किया जा सकता है और फली छेदक, पत्ती रोग और मूह के हमले से बचाव के लिए रसायनिक पदार्थ का प्रयोग भी निर्धारित किया जा सकता है। यदि फलियाँ पक चुकी हों, तो उन्हें भंडारण से पहले अच्छी तरह सुखाया जा सकता है। हालांकि, तुड़ाई के बाद उत्पाद को छाया में सुखाना चाहिए।
सरसों	पके हुए फली को तोड़कर अच्छी तरह सुखा लेना चाहिए, फिर उनकी थ्रेशिंग करनी चाहिए। तोड़ी की हुई फलियों को हमेशा ढके हुए स्थान पर सुखाना चाहिए।
गेहूँ	फसल की हानि से बचने के लिए खरपतवारों को नष्ट कर देना चाहिए और खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए खरपतवारनाशक का प्रयोग करना चाहिए। पीले और भूरे रतुआ रोग की स्थिति में, 500 लीटर पानी में 500 मिलीलीटर/हेक्टेयर की दर से टेबुकोनाजोल 250 ईसी का प्रयोग करके नियंत्रण करना चाहिए और मूह के हमले की स्थिति में, 500 लीटर पानी में 750 मिलीलीटर मेटासिस्टॉक्स प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर सिंचाई करें।
गन्ना	वसंत ऋतु में बोई गई गन्ने की फसल में आवश्यकतानुसार सिंचाई और नियमित निराई-गुड़ाई करनी चाहिए। शरद ऋतु में बोई गई गन्ने की फसल और नई गन्ने की फसल में सिंचाई के बाद यूरिया की ऊपरी खाद डालनी चाहिए।
चारा मक्की	फरवरी में बोई गई फसल की सिंचाई करनी चाहिए और 3-4 दिन बाद यूरिया की टॉप-ड्रेसिंग करनी चाहिए।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
सेम की फली	आवश्यकतानुसार सिंचाई की जानी चाहिए और नियमित रूप से निराई-गुड़ाई का कार्य किया जाना चाहिए।
गाजर	यूरोपीय किस्मों की बुवाई की जा सकती है।
मूली	यूरोपीय किस्मों की बुवाई की जा सकती है।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भैंस	गर्भवती पशुओं में प्रसवोत्तर ज्वर से बचाव के लिए, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने हेतु उन्हें प्रतिदिन 50-60 ग्राम खनिज मिश्रण खिलाना चाहिए, क्योंकि इस दौरान वे बांझपन और जॉन रोग (पैराट्यूबरकुलोसिस) के प्रति संवेदनशील होते हैं। वयस्क पशुओं में, फुट एंड माउथ रोग के टीकाकरण से 15 दिन पहले कृमिनाशक दवा का प्रयोग करना आवश्यक है।
गाय	गर्भवती पशुओं में प्रसवोत्तर ज्वर से बचाव के लिए, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने हेतु उन्हें प्रतिदिन 50-60 ग्राम खनिज मिश्रण खिलाना चाहिए, क्योंकि इस दौरान वे बांझपन और जॉन रोग (पैराट्यूबरकुलोसिस) के प्रति संवेदनशील होते हैं। वयस्क पशुओं में, फुट एंड माउथ रोग के टीकाकरण से 15 दिन पहले कृमिनाशक दवा का प्रयोग करना आवश्यक है।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

कोई खास चेतावनी नहीं मिली है, इसलिए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

कोई सलाह नहीं।

Farmers are advised to download Unified  Mausam  and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>