



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
उधम सिंह नगर, पंतनगर, उत्तराखंड



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 05-05-2026

नैनीताल(उत्तराखंड) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-05-05 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-05-06	2026-05-07	2026-05-08	2026-05-09	2026-05-10
वर्षा (मिमी)	7.0	1.0	6.0	5.0	1.0
अधिकतम तापमान(से.)	14.0	15.0	16.0	17.0	19.0
न्यूनतम तापमान(से.)	9.0	10.0	10.0	11.0	13.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	74	71	73	70	64
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	25	45	44	41	33
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	9	10	9	5	8
पवन दिशा (डिग्री)	130	110	140	130	150
क्लाउड कवर (ओक्टा)	5	5	4	4	3
चेतावनी	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	कोई चेतावनी नहीं

पूर्वानुमान सारांश:

आगामी दिनों में 5 से 9 मई के बीच इस क्षेत्र में 1-7 मिमी हल्की बारिश होने की संभावना है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 14-19 डिग्री सेल्सियस और 9-13 डिग्री सेल्सियस रहेगा। हवा दक्षिण-पूर्व, पूर्व-दक्षिण-पूर्व और दक्षिण-पूर्व-दक्षिण दिशा से 5-10 किमी प्रति घंटे की गति से चलेगी। 5 से 9 मई के बीच बहुत हल्की बारिश की संभावना है। 5 से 8 मई के बीच गरज के साथ तूफ़ान, बिजली गिरने, तेज हवाओं (40-50 किमी प्रति घंटे और 30-40 किमी प्रति घंटे की गति), आंधी और तेज सतही हवाओं के लिए पीली चेतावनी जारी की गई है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

आंधी, बिजली, तेज हवाएं और सतह पर तेज हवाएं।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

सुखाने के लिए रखी गई फसल की कटाई के बाद उसका खराब होना और नई बोई गई फसल के अंकुरण को नुकसान पहुंचना। कटाई के बाद की फसल को ढककर और अच्छी तरह हवादार जगह पर अच्छी तरह से संग्रहित

किया जाना चाहिए, नई बोई गई फसल की सिंचाई से बचना चाहिए और उचित जल निकासी की व्यवस्था करनी चाहिए।

सामान्य सलाहकार:

मौसम का पूर्वानुमान "मौसम ऐप" पर नियमित रूप से अपडेट किया जाता है और मौसम संबंधी कृषि-सलाह "मेघदूत ऐप" पर नियमित रूप से अपडेट की जाती है। बिजली गिरने की जानकारी प्राप्त करने के लिए "दामिनी ऐप" उपलब्ध है। मौसम, मेघदूत और दामिनी ऐप गूगल प्ले स्टोर (एंड्रॉइड उपयोगकर्ता) और ऐप सेंटर (आईओएस उपयोगकर्ता) से डाउनलोड किए जा सकते हैं। 1 से 7 मई तक के विस्तारित पूर्वानुमान में सामान्य से अधिक वर्षा, सामान्य अधिकतम तापमान और सामान्य से कम न्यूनतम तापमान का संकेत दिया गया है।

लघु संदेश सलाहकार:

मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, आंधी-तूफान और बिजली गिरने की संभावना है, इसलिए फसल को ढके हुए स्थान पर रखें और खुले में न छोड़ें। बुवाई में देरी करें।

फसल विशिष्ट सलाह:

फसल	फसल विशिष्ट सलाह
गेहूँ	कटाई के बाद प्राप्त उपज को ढके हुए स्थान पर सुखाना चाहिए और सूखी उपज को अच्छी तरह से छानकर हवादार और ढके हुए स्थान पर अच्छी तरह से संग्रहित करना चाहिए।
चना	कटाई के बाद प्राप्त उपज को ढके हुए स्थान पर सुखाना चाहिए और सूखी उपज को अच्छी तरह से छानकर हवादार और ढके हुए स्थान पर अच्छी तरह से संग्रहित करना चाहिए।
मसूर की दाल	कटाई के बाद प्राप्त उपज को ढके हुए स्थान पर सुखाना चाहिए और सूखी उपज को अच्छी तरह से छानकर हवादार और ढके हुए स्थान पर अच्छी तरह से संग्रहित करना चाहिए।
सरसों	कटाई के बाद प्राप्त उपज को ढके हुए स्थान पर सुखाना चाहिए और सूखी उपज को अच्छी तरह से छानकर हवादार और ढके हुए स्थान पर अच्छी तरह से संग्रहित करना चाहिए।
चावल	मध्यम और ऊँची पहाड़ियों में सिंचाई की स्थिति में नर्सरी तैयार करने का काम बारिश के बाद ही करना चाहिए। चेतकी धान में नियमित निराई-गुड़ाई का काम गीले मौसम में टाल देना चाहिए।
अरहर (लाल चना/अरहर)	बुवाई में देरी करनी चाहिए और बारिश होने के बाद बुवाई का समय निर्धारित करना चाहिए।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
सेम की फली	सभी रसायनिक प्रयोगों को स्थगित कर देना चाहिए और बारिश होने के बाद ही उनका प्रयोग करना चाहिए।
राजमा/ लोबिया	सभी रसायनिक प्रयोगों को स्थगित कर देना चाहिए और बारिश होने के बाद ही उनका प्रयोग करना चाहिए।
टमाटर	रोपाई के तुरंत बाद सिंचाई आवश्यक होती है, लेकिन बरसात के मौसम में सिंचाई में देरी करनी चाहिए। एक महीने पुरानी रोपाई की गई फसल में बारिश के बाद यूरिया की खाद डालनी चाहिए।
बैंगन	रोपाई के तुरंत बाद सिंचाई आवश्यक होती है, लेकिन बरसात के मौसम में सिंचाई में देरी करनी चाहिए। एक महीने पुरानी रोपाई की गई फसल में बारिश के बाद यूरिया की खाद डालनी चाहिए।
शिमला मिर्च	रोपाई के तुरंत बाद सिंचाई आवश्यक होती है, लेकिन बरसात के मौसम में सिंचाई में देरी करनी चाहिए। एक महीने पुरानी रोपाई की गई फसल में बारिश के बाद यूरिया की खाद डालनी चाहिए।
कद्दू	कद्दू परिवार की सभी कुकुरबिटेसी फसलों के लिए रसायनिक प्रयोगों को स्थगित कर देना चाहिए और बारिश के बाद ही निर्धारित करना चाहिए।
गोभी	बुवाई में देरी करनी चाहिए और बारिश के बाद बुवाई का समय निर्धारित करना चाहिए।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भैंस	पशुओं को अच्छी हवादार जगहों पर रखना चाहिए और उन्हें लगातार पर्याप्त पानी उपलब्ध कराना चाहिए। उचित पंखे और कूलर की व्यवस्था करनी चाहिए और पशुओं को शांत रखने के लिए उन्हें नियमित रूप से ठंडे पानी से धोना चाहिए। दो महीने की उम्र के पशुओं को पाइपेराज़ीन नामक कृमिनाशक दवा देनी चाहिए और दो से चार महीने की उम्र के पशुओं को लंगड़ापन और बुखार के खिलाफ टीका लगवाना चाहिए।
गाय	पशुओं को अच्छी हवादार जगहों पर रखना चाहिए और उन्हें लगातार पर्याप्त पानी उपलब्ध कराना चाहिए। उचित पंखे और कूलर की व्यवस्था करनी चाहिए और पशुओं को शांत रखने के लिए उन्हें नियमित रूप से ठंडे पानी से धोना चाहिए। दो महीने की उम्र के पशुओं को पाइपेराज़ीन नामक कृमिनाशक दवा देनी चाहिए और दो से चार महीने की उम्र के पशुओं को लंगड़ापन और बुखार के खिलाफ टीका लगवाना चाहिए।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

फसल का खराब होना और बुवाई में देरी होना।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

कटाई के बाद फसल को अच्छी तरह हवादार जगह पर रखें और उसे खुले में न छोड़ें। फसलों की बुवाई में देरी करें।