

पशुपालन भी गाजरघास से प्रभावित

पंतनगर:— आज दिनांक अगस्त 18, 2023 को 18 वॉ गाजर घास जागरूकता एवं उन्मूलन कार्यक्रम के तीसरे दिन का कार्यक्रम शैक्षणिक डेयरी फार्म, नगला, पंतनगर पर आयोजित किया गया। जिसके प्रारंभ में डा. क्रान्ति कुमार, सह-प्राध्यापक, सस्य विज्ञान विभाग एवं सहायक निदेशक, शैक्षणिक डेयरी फार्म ने आये हुये अतिथिगणों डा. एस. पी. सिंह, प्राध्यापक एवं परियोजना अधिकारी, सस्य विज्ञान एवं संयुक्त निदेशक डा. एस. के. सिंह, सहनिदेशक डा. रिपुसुदन कुमार, सहायक निदेशक क्रमशः डा. संदीप कुमार तलवार, डा. सुनील कुमार शैक्षणिक डेयरी फार्म नगला पंतनगर एवं उपस्थित सभी सहभागियों का स्वागत करते हुए गाजर घास जागरूकता अभियान के बारे में अवगत कराया तथा कार्यक्रम को अग्रसर करते हुए डा. एस. पी. सिंह, को कार्यक्रम की बागडोर सौंपी। उन्होंने कहा कि जागरूकता अभियान राष्ट्रीय स्तर पर सप्ताहिक रूप में मनाया जाता है, जिसको सफल बनाने के लिए सभी की प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सहभागिता जरूरी है। साथ ही उन्होंने गाजर घास से होने वाले दुष्परिणामों का उल्लेख किया तथा कृषि वैज्ञानिकों को इसके उन्मूलन में आने वाली चुनौतियों तथा इसके निवारण हेतु जानकारी दी। डा. सिंह ने बताया कि गाजरघास के पौधे में छोटे-छोटे रोयें पाये जाते हैं जो शरीर के सम्पर्क में आने पर दाद, खाज, खुजली आदि पैदा करते हैं। धीरे-धीरे ये दाद एक्जिमा का रूप ले जाता है तथा परागकणों के श्वसन तंत्र में जाने से श्वास संबंधित बीमारियां जैसे अस्थमा आदि होने की संभावना होती है। डा. सिंह ने बताया कि पशुओं के लिए भी यह गाजरघास अत्यधिक विशाक्त होती है इसको खाने से पशुओं में अनेक प्रकार के रोग जैसे खुजली, एलर्जी आदि हो जाती है और पशुओं में त्वचा संबंधी अन्य बीमारियां उत्पन्न हो जाती है एवं पशुओं के घाव भरने में समय लगता है। इस घास को खाने से दुधारू पशुओं के दूध में कड़वाहट के साथ – साथ दूध उत्पादन में भी कमी आने लगती है एवं इस दूध को मनुष्यों द्वारा सेवन करने से मनुष्यों में भी कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। गाजरघास के नियंत्रित करने के लिए देशी गेंदा तथा चकवड़ बहुत लाभकारी हैं जिसके बीज आस-पास के क्षेत्र में छिड़कने से इस गाजरघास पर काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है। रसायनों के प्रयोग के साथ-साथ इसका नियंत्रण मैक्सीकन बीटल (जाइगोग्रामा बार्कोलोरेटा) द्वारा भी किया जा सकता है। एक वयस्क बीटल एक पार्थीनियम के पूर्ण पौधे को 6-8 सप्ताह में खा जाता है। इस बीटल में प्रजनन की अद्भुत क्षमता होती है एक स्थान पर जहाँ पार्थीनियम अच्छी मात्रा में हो कम से कम 500 से 1000 तक वयस्क बीटल छोड़ने चाहिए। तदोपरान्त डा. एस. पी. सिंह ने डा. एस. के. सिंह को आमंत्रित करते हुए सभी उपस्थित गणों का आभार व्यक्त किया तथा गाजर घास से होने वाले नुकसान तथा इसके नियंत्रण की अनेक विधियों को संक्षिप्त करते हुए अपने परिसर को गाजर घास से मुक्त करने हेतु संकल्प लेने की बात की।

अन्त में उपस्थित महानुभावों एवं वैज्ञानिकों को मास्क एवं दस्ताने वितरित किए तदोपरान्त उपस्थित कार्मिकों ने फार्म के भीतर मौजूद गाजर घास का उन्मूलन किया तथा मैक्सीकन बीटल कीट छोड़े गए। जागरूकता सप्ताह कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभा में कृषि महाविद्यालय, गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय, पंतनगर से कृषि वैज्ञानिकों, एस0आर0एफ0, आर0एफ0, डी0पी0ए0 एवं श्रमिकों सहित लगभग 80 लोगों ने भागीदारी की।

